

## **Fatalno intracerebralno krvarenje na dvojnoj antitrombocitnoj terapiji kod pacijenta sa infarktom miokarda bez ST elevacije koji je lečen urgentnom perkutanom koronarnom intervencijom**

Marijan Spasic<sup>1</sup>, Zoran Jovic<sup>1</sup>, Nemanja Djenic<sup>1</sup>, Boris Dzudovic<sup>1</sup>, Predrag Djuric<sup>1</sup>, Radoslav Romanovic<sup>1,2</sup>, Slobodan Obradovic<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>*Klinika za kardiologiju i urgentnu internu medicinu, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija,*

<sup>2</sup>*Medicinski fakultet, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija*

Po važećim smernicama za upotrebu dvojne antiagregacione terapije u pacijenata sa infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) primena dvojne antiagregacione terapije-ASA i ticagrelora se preporučuje (klasa I nivo dokaza B). Prikazujemo slučaj uspešne urgentne perkutane koronarne intervencije ( hitna PCI) kod pacijenta sa infarktom miokarda bez ST elevacije , koji je dobio udarnu dozu ticagrelora nakon učinjene koronarografije. Verifikovana je subtotalna stenoza desne koronarne arterije i učinjena implantacija stenta. Naš slučaj je pokazao primenu 2015. ESC smernica za primenu dvojne antiagregacione terapije u pacijenata sa NSTEMI. Procedura je bila uspešna, bez periproceduralnih komplikacija ali je oko 22 sata sledećeg dana došlo do fatalnog intrakranijalnog krvarenja a 48 sati od intervencije i do letalnog ishoda.

**Ključne reči:** infarkt miokarda bez ST elevacije; dvojna antiagregaciona terapija, perkutana koronarna intervencija, intracerebralna hemoragija